

### Памятка для населения по сибирской язве

**Сибирская язва** - одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний животных (крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней и др.) и человека с очень высокой смертностью. Возбудитель сибирской язвы устойчив в окружающей среде. В почве он сохраняется столетиями. Длительность и признаки заболевания многообразны. Заболевание поражает как отдельные органы, так и организм в целом.

**Возбудитель** - спорообразующая бактерия, устойчивая к физико-химическим воздействиям, которая может сохраняться во внешней среде столетиями.

**Источник возбудителя** - больное животное, экскременты заболевших животных (кал, моча, кровянистые истечения из естественных отверстий), а также зараженные сибирезвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней среды.

**Основной путь заражения** у человека происходит при уходе за больными животными, в процессе их убой, снятия шкур, разделки туш, кулинарной обработки мяса, при хранении, транспортировке. В зависимости от путей заражения у человека развивается кожная, кишечная, легочная формы сибирской язвы.

**Инкубационный период** длится от 2 до 14 дней.

#### Клинические симптомы:

**При кожной форме** в месте поражения возникает красное пятно, которое приподнимается над уровнем кожи, затем появляется язва, сильный зуд и жжение пораженного места. Вокруг язвы отмечаются отек и покраснение кожи. Характерным является снижение или полное отсутствие чувствительности в области язвы. Присоединяются признаки общей интоксикации (повышение температуры до 39-40°C, общая слабость, разбитость, сильная головная боль, головокружение, сердцебиение).

**При легочной форме** сибирской язвы первые признаки похожи на грипп - повышается температура, человека сильно знобит, начинает сильно выделяться мокрота из груди. Через 3-5 дней развивается острая легочная недостаточность, которая приводит к шоку и смерти.

**При кишечной форме** сибирской язвы начинаются сильные боли в животе, рвота, жидкий стул с кровью.

#### Для предупреждения заболевания сибирской язвой необходимо:

- немедленно сообщать обо всех случаях заболевания и падежа животных в ветеринарные учреждения;
- приглашать ветеринарного специалиста для проведения предубойного осмотра животного;
- использовать индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки, халат) при убойе домашних животных;
- не приобретать сырое молоко и мясо в местах несанкционированной торговли, без наличия ветеринарных сопроводительных документов;
- при приготовлении мяса готовить небольшими кусками, с проведением термической обработки не менее часа.